

HEALBOND MP & HEALBOND MAX

SI PUISSANT, MAIS SI SIMPLE À UTILISER!

MULTI-INDICATION SANS ACTIVATEUR

Au sein de la gamme ELSODENT, les systèmes de collage HEALBOND MP & HEALBOND MAX s'utilisent sans activateur quel que soit le matériau:

- > Composites photo-polymérisables, auto-polymérisables, et à prise duale,
- > Résines-ciments universels

> + RAPIDE, + SIMPLE, + ÉCONOMIQUE...

>>> SO SMART!

RESTAURATION

PureFill Flow

PUREFILL FLOW

PureFill 2

PUREFILL 2

ADHÉSION

HEALBOND MP

HEALBOND MAX

RECONSTITUTION

Core D Flow

CORE D FLOW

CORE D

InnoCem

SCELLEMENT

HEALBOND MP



Adhésif universel auto-mordançant photo-polymérisable
Formulation sans addition de HEMA, TEGDMA, BisGMA

AVANTAGES

MULTI-INDICATIONS

Restaurations directes et indirectes

UNIVERSEL

Adhésion puissante sur structures dentaires, composite, céramique, métal, zircon

Résistance à la micro-traction (μ TS) > 48 MPa (SE) et > 50 MPa (E&R)*

Diminue l'hypersensibilité en éliminant le biofilm bactérien

TOUT-EN-UN !



NOUVEAU

Formulation optimisée de **CORE D & INNOCEM** pour utilisation duale de **HEALBOND MP SANS ACTIVATEUR**

REFERENCES & PRESENTATIONS

BMP-5 Adhésif universel photo-polymérisable - Flaçon 5ml

BA-5 Activateur - Flaçon de 5ml

Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)


PRODUITS	ADHÉSIF	ACTIVATEUR	INDICATIONS
PUREFILL 2 PUREFILL FLOW	✓	✗	Restaurations directes photo-polymérisables antéro-postérieures classes I à V
CORE D CORE D FLOW	✓	✗	Reconstitutions directes duales corono-radiculaires Scellement de tenons radiculaires
INNOCEM	✓	✗	Collage des restaurations indirectes peu rétentives (petits inlays et facettes céramiques et composites, bridges "Maryland")

*TESTS PHYSICO-CHIMIQUES COMPARATIFS

Résistance à la micro-traction (μ TBS). Efficacité de collage sur dentine à 7 jours et 2 mois (50 000 cycles)

Données extraites du rapport de
KU Leuven BIOMAT,
Van Meerbeek et al., 2020

Auto-mordançage (SE)



Mordançage + rinçage (E&R)

